

ПАМЯТКА

владельцам животных

по предотвращению заноса и распространения

Африканской чумы свиней

(болеют домашние и дикие свиньи)

Для сохранения здоровья животных и избежание экономических потерь -
знай, помни, делай:

- содержи поголовье свиней по закрытому типу (запрет свободного выгула на территории населенных пунктов и в лесной зоне);
- ежедекадно обрабатывай свиней и помещения от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох);
- постоянно проводи борьбу с грызунами;
- используй в рационе свиней корма животного происхождения только в проваренном виде;
- не завози свиней без согласования с Госветслужбой;
- не приобретай свиней у лиц не имеющих разрешения на реализацию - ветеринарного свидетельства;
- не допускай хозяйственную связь с неблагополучными территориями – Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская области;
- при любых признаках ухудшения здоровья животных вызывай ветеринарного врача;
- срочно сообщи государственной ветеринарной службе обо всех случаях падежа домашних и диких свиней



Если не будешь **ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ И ДЕЛАТЬ** – можешь стать **свидетелем, участником, виновником** обязательных мероприятий:

- наложение карантина на место возникновения очага инфекции;
- уничтожение бескровным способом в очаге инфекции всего свиноголовья;
- сжигание трупов свиней, инвентаря и помещений для их содержания;
- ликвидация всех свиней в радиусе десятикилометровой зоны от очага инфекции;
- карантин и ограничения снимаются через шесть месяцев после убоя свиней;
- разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается через год после снятия карантина.

**Болезнь легче и дешевле предупредить,
чем с ней бороться!!!**

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) – высококонтагиозная инфекционная болезнь свиней. Характеризуется лихорадкой, кровозлияниями на коже, слизистых оболочках и внутренних органах. Гибель животных наступает в 100% случаев.

ВОЗБУДИТЕЛЬ – ДНК ВИРУС

- ✓ Высокоустойчив во внешней среде;
- ✓ При 5°C сохраняется 5-7 лет, при 18°C – 18 мес., при 37°C – 10-30 дней.

Болеют только свиньи, независимо от возраста и в любое время года.

ВИРУС СОХРАНЯЕТСЯ:

- ✓ В почве до 112 дней;
- ✓ В сыром мясе до 188 дней;
- ✓ В копченном мясе до 5 месяцев.

ВИРУС ИНАКТИВИРУЕТСЯ (ПОГИБАЕТ):

- ✓ В трупах животных через 2 месяца;
- ✓ В замороженных тушах через 6-10 лет.
- ✓ Во внешней среде на вирус губительно действуют препараты хлора (5% раствор хлорной извести) при воздействии в течение 4-х часов.

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЧС:

- ✓ Алиментарно (через пищу);
- ✓ Аэрогенно (через воздух), контактно;
- ✓ Трансмиссивно (через насекомых).
- ✓ Механическими переносчиками могут быть люди, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые (клещи, вши, блохи, мухи).

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- ✓ Недопущение заноса вируса из неблагополучной территории;
- ✓ Соблюдение правил предосторожности при ввозе животных, продуктов животноводства и кормов;
- ✓ Соблюдение строжайших мер карантинирования животных;
- ✓ Ежедневная обработка свиней и помещений для их содержания от кровососущих насекомых и грызунов.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС АЧС?

- ✓ Не допускать ввоз/вывоз свиней за пределы хозяйства без ветеринарного осмотра;
- ✓ Не допускать свободного выгула свиней, контакта с другими животными и посторонними лицами;
- ✓ В случае заболевания или падежа свиней немедленно информировать государственную ветеринарную службу;
- ✓ Не выбрасывать трупы животных, отходы их содержания и переработки на свалки, обочины дорог и в лесные массивы (уничтожение проводить в местах определенных администрацией поселения под контролем государственной ветеринарной службы);
- ✓ Не использовать в кормлении свиней боенские и кухонные отходы, корма животного происхождения без термической обработки;
- ✓ Не покупать мясо, полученное при подворном убое животных без ветеринарно-санитарной экспертизы, и в местах несанкционированной торговли.

**ЛЕЧЕНИЕ АЧС НЕ РАЗРАБОТАНО!
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ВАКЦИНА)
ОТСУТСТВУЕТ!**