

Выпуск № 23 (286) от 30.06.2020 г.
Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



АНОНС

29 июня 2020

Спросите у самарского Росреестра о земельных участках

6 июля с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области **Павел Евгеньевич Найдовский** ответит на вопросы о постановке на кадастровый учет и о регистрации прав земельных участков, установлении границ земельных участков, внесении сведений о ранее учтенных земельных участках в Единый государственный реестр недвижимости, а также о внесении изменений в сведения об адресе, категории и разрешенном использовании земельных участков.

Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.

Контакты для СМИ:

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра
(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) – высококонтагиозная инфекционная болезнь свиней. Характеризуется лихорадкой, кровозлияниями на коже, слизистых оболочках и внутренних органах. Гибель животных наступает в 100% случаев.

ВОЗБУДИТЕЛЬ – ДНК ВИРУС

- ✓ Высокоустойчив во внешней среде;
- ✓ При 5°C сохраняется 5-7 лет, при 18°C – 18 мес., при 37°C – 10-30 дней.

Болеют только свиньи, независимо от возраста и в любое время года.

ВИРУС СОХРАНЯЕТСЯ:

- ✓ В почве до 112 дней;
- ✓ В сыром мясе до 188 дней;
- ✓ В копченном мясе до 5 месяцев.

ВИРУС ИНАКТИВИРУЕТСЯ (ПОГИБАЕТ):

- ✓ В трупах животных через 2 месяца;
- ✓ В замороженных тушах через 6-10 лет.
- ✓ Во внешней среде на вирус губительно действуют препараты хлора (5% раствор хлорной извести) при воздействии в течение 4-х часов.

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЧС:

- ✓ Алиментарно (через пищу);
- ✓ Аэрогенно (через воздух), контактно;
- ✓ Трансмиссивно (через насекомых).
- ✓ Механическими переносчиками могут быть люди, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые (клещи, вши, блохи, мухи).

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- ✓ Недопущение заноса вируса из неблагополучной территории;
- ✓ Соблюдение правил предосторожности при ввозе животных, продуктов животноводства и кормов;
- ✓ Соблюдение строжайших мер карантинирования животных;
- ✓ Ежедневная обработка свиней и помещений для их содержания от кровососущих насекомых и грызунов.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС АЧС?

- ✓ Не допускать ввоз/вывоз свиней за пределы хозяйства без ветеринарного осмотра;
- ✓ Не допускать свободного выгула свиней, контакта с другими животными и посторонними лицами;
- ✓ В случае заболевания или падежа свиней немедленно информировать государственную ветеринарную службу;
- ✓ Не выбрасывать трупы животных, отходы их содержания и переработки на свалки, обочины дорог и в лесные массивы (уничтожение проводить в местах определенных администрацией поселения под контролем государственной ветеринарной службы);
- ✓ Не использовать в кормлении свиней боенские и кухонные отходы, корма животного происхождения без термической обработки;
- ✓ Не покупать мясо, полученное при подворном убое животных без ветеринарно-санитарной экспертизы, и в местах несанкционированной торговли.

**ЛЕЧЕНИЕ АЧС НЕ РАЗРАБОТАНО!
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ВАКЦИНА)
ОТСУТСТВУЕТ!**

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (лат. *Pestis africana suum*), африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку А согласно Международной классификации заразных болезней животных. **Для человека африканская чума свиней опасности не представляет!!!** Употреблять в пищу свинину безопасно, поскольку вирус погибает при термической обработке в 70 градусов.

Возбудитель африканской чумы свиней — ДНК-содержащий вирус семейства *Asfarviridae*, рода *Asfivirus*; сохраняется в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых термической обработке (солёные и сырокопчёные пищевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм свиньям). Установлено несколько сероиммуно- и генотипов вируса африканской чумы свиней. Его обнаруживают в крови, лимфе, во внутренних органах, секретах и экскретах больных животных. Вирус устойчив к высушиванию и гниению; при температуре 60°C инактивируется в течение 10 минут.

Самая большая опасность этого заболевания состоит в следующем:

Вакцины и методов лечения не существует.

Все свинопоголовье, куда попадает вирус, погибает.

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заболевание сопровождается лихорадкой, параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями. Источник возбудителя инфекции — больные животные и вирусоносители. Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. Факторы передачи

возбудителя — корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Использование в корм необезвреженных столовых отходов способствует распространению возбудителя. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарами вируса в природе являются африканские дикие свиньи и клещи рода орнитодорос. Инкубационный период заболевания зависит от количества поступивших в организм микроорганизмов, состояния животного, тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток.

Оздоровительные мероприятия сводятся к следующему:

В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного пункта, ферма, где обнаружены больные животные) все свинопоголовье умерщвляется бескровным методом и сжигается.

В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага) – поголовный убой всех свиней на мясокомбинате с выработкой варенных колбас или консервов. Запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за его пределы в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), а также в последующие 6 месяцев - свиней и продукции свиноводства.

Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение ярмарок, выставок.

Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается только через год после снятия карантина.

Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:

предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);

содержать поголовье только закрытым (в базах, сараях), не допускать свободного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне;

ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;

не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы в рационах свиней;

ограничить связи с неблагополучными территориями;

немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.

НЕ ДОПУСКАТЬ:

- свободного выгула свиней из помещений;

- контакта свиней с другими животными и посторонними лицами, с синантропной птицей, применять сплошные ограждения, специальные сетки и т.д;

- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:

- для кормления и ухода за свиньями иметь отдельную обувь и одежду;

- в случае появления заболевания свиней и их гибели **НЕМЕДЛЕННО** обратиться в ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского поселения;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и выработки на свалки, обочины и другие места;

- проводить утилизацию в местах, определенных администрацией сельских поселений;

- не ввозить свиней без разрешения ветеринарной службы.

ПОМНИТЬ:

Выполнение Вами требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).

ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания (месту жительства), в ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение»: 8 (846) 9510021, 8 (846) 9510031, или в департамент ветеринарии Самарской области по телефонам: 8 (846) 3370806, 8 (846) 3370608 или в департамент охоты и рыболовства Самарской области по телефону: (846)2077795.

Издатель – Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Редактор: Т.Н.Шлычкова

Адрес газеты «Малоглушицкие Вести»: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица, ул. Советская, 60.

Электронный адрес: spmalyglushitsa@yandex.ru; tanya03101963@mail.ru

Отпечатано в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Соучредители: Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Номер подписан в печать в 10.00 час. 30.06.2020 г., тираж 100 экземпляров, «Бесплатно».