



Главам сельских поселений
(по списку)

Государственное бюджетное учреждение
Самарской области

«Самарское ветеринарное объединение»

443081, г. Самара ул. Фадеева, 47

т./ф (846) 951-64-98

e-mail: gvi_so_svo@mail.ru

Структурное подразделение
«Большеглушицкая СББЖ»

446180, с. Большая Глушица,

Ул. Ярмарочная, 3

e-mail: quvetbq@yandex.ru

Тел. 8846 73 2-19-72

Исх. № 200 от 22.10.2024 г

Структурное подразделение «Большеглушицкая СББЖ» направляет Вам памятки для населения «Чума мелких жвачных животных» и «Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота». Необходимо распространить и ознакомить всех граждан на официальных сайтах администрации поселения.

и.о.начальника
с.п. «Большеглушицкой СББЖ»

Цуканова Л.М

Памятка для населения

Чума мелких жвачных животных

ЧМЖЖ) – высококонтагиозная вирусная болезнь овец и коз, протекающая преимущественно остро или подостро, характеризующаяся лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии

ЧМЖЖ вызывает РНК-содержащий вирус.

ЧМЖЖ относится к числу наиболее опасных вирусных болезней овец и коз. В России данная болезнь не регистрируется, однако, учитывая ее широкое распространение в мире, существует реальная угроза заноса ЧМЖЖ на территорию нашей страны.

Вирус ЧМЖЖ поражает не только домашних овец и коз, но и диких коз, а также сайгаков, газелей и другие виды жвачных животных. Крупный рогатый скот не болеет ЧМЖЖ. Козы более восприимчивы, чем овцы. Человек к вирусу чумы мелких жвачных не восприимчив.

Экономический ущерб, наносимый козоводству и овцеводству, чрезвычайно велик. Смертность в первичных очагах может достигать 100%, а на стационарно неблагополучных территориях — до 50%. Прямые убытки обуславливаются гибелью животных, снижением продуктивности (удоев молока, качества и привеса мяса, потеря шерсти и пуха), а также затратами на проведение карантинных мероприятий.

Основой профилактики ЧМЖЖ является недопущение заноса возбудителя болезни из неблагополучных хозяйств и территорий с инфицированными животными.

Владельцам животных необходимо:

- провести идентификацию всех видов сельскохозяйственных животных;
- не допускать приобретения животных без ветеринарных сопроводительных документов;
- приобретать животных только из благополучных хозяйств;
- карантинировать в течение 30 дней ввезённых животных для проведения необходимых исследований и обработок;
- все перемещения, сдачу на убой, реализацию животноводческой продукции производить только под контролем госветслужбы;
- в период пастбищного сезона, животных следует выпасать на отдельных участках пастбищ с изолированным водопоем и выпасом, отдельным для каждого вида животных, а также исключаящим контакт с дикими животными;
- при уходе за животными использовать чистую, дезинфицированную спецодежду, систематически проводить очистку и дезинфекцию помещений для содержания мелкого рогатого скота;
- при подозрении на заболевание домашних животных и наличии характерных признаков ЧМЖЖ, необходимо незамедлительно информировать об этом государственное ветеринарное учреждение «Большеглушицкая СББЖ».

Памятка для населения

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота

КРС (КПП) – высококонтагиозная респираторная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, фибринозной интерстициальной пневмонией, серозно-фибринозным плевритом с последующим образованием анемических некрозов и секвестров в легких, скоплением большого количества экссудата в грудной полости.

Болезнь проявляется в отсутствии у животных аппетита, лихорадке, а также в затрудненном и учащенном дыхании, кашле и выделениях из носа.

Источник возбудителя инфекции – больные и переболевшие КПП животные, у которых возбудитель инфекции выделяется в окружающую среду с истечениями из носа, при кашле, а также с мочой, калом, молоком и околоплодной жидкостью. Основной путь передачи болезни – воздушно-капельный. Кроме того, не исключается передача бактерий с кормом через желудочно-кишечный тракт, половым и трансплацентарным (от матери к ребенку) путями, а также через насекомых.

Особую опасность представляют хронические больные животные, которые с истечениями из носа, бронхиальным течением при кашле выделяют возбудителя в окружающую среду.

Инкубационный период при естественном заражении длится 2–4 недели, иногда до 6 месяцев. В среднем болезнь продолжается 40–45 дней, однако полного выздоровления животного не наступает.

Лечение ввиду опасности распространения болезни запрещено. Больных животных направляют на убой.

Россия благополучна по КПП, но учитывая ее широкое распространение в мире, существует реальная угроза заноса КПП КРС на территорию нашей страны.

С целью предотвращения заноса возбудителя болезни на территорию хозяйства, владельцам животных необходимо соблюдать следующие требования:

- проводить идентификацию всех видов сельскохозяйственных;
- приобретать животных только из благополучных хозяйств и только с ветеринарными сопроводительными документами;
- отправлять только что купленных животных на 30-дневный карантин для проведения необходимых исследований и обработок;

- все перемещения, сдачу на убой, реализацию животноводческой продукции проводить только под контролем госветслужбы;

- во время пастбищного сезона пасти животных на отдельных участках с изолированным водопоем и отдельным для каждого вида животных выпасом, а также исключать контакт с дикими животными;

- при уходе за животными использовать чистую, дезинфицированную спецодежду, своевременно чистить и дезинфицировать помещения для содержания мелкого рогатого скота;

- при подозрении на заболевание животных и наличии характерных признаков КПП КРС, необходимо незамедлительно информировать об этом ближайшее государственное ветеринарное учреждение.

Обо всех случаях заболевания животных, в том числе при подозрении на контактную плевропневмонию крупного рогатого скота, информируйте Государственную ветеринарную службу «Большеглушицкая СББЖ» .